



DER ARZNEIMITTELBRIEF

Unabhängige Arzneimittelinformationen

Jahrgang 54 Nr. 03 März 2020

Frage 1 **1** 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Um wieviel hat die Verordnung von Antidepressiva in Deutschland in den letzten 10 Jahren zugenommen? [Link zum Artikel](#)

- a) 10%
- b) 20%
- c) 30%
- d) 40%
- e) 50%



Jahrgang 54 Nr. 03 März 2020

Frage 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Für welches der genannten Antidepressiva wurde in einem systematischen Review aus dem Jahre 2016 kein Zusammenhang mit einer Gewichtszunahme gefunden? [Link zum Artikel](#)

- a) Duloxetin
- b) Sertralin
- c) Trizyklische Antidepressiva
- d) Fluoxetin
- e) Mirtazapin

Jahrgang 54 Nr. 03 März 2020

Frage 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was zählt nicht zu den Risikofaktoren für eine starke Gewichtszunahme unter einer Behandlung mit Antipsychotika? [Link zum Artikel](#)

- a) eine rasche Gewichtszunahme in den ersten Behandlungswochen
- b) ein hoher Ausgangs-BMI
- c) eine familiäre Belastung mit Adipositas
- d) hohe Antipsychotika-Dosen
- e) eine lange Behandlungsdauer



Jahrgang 54 Nr. 03 März 2020

Frage 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welches der genannten Diuretika wird nicht zu den Thiaziden und deren Analoga gezählt? Link zum Artikel [↗](#)

- a) Chlortalidon
- b) HCT
- c) Torasemid
- d) Indapamid
- e) Xipamid

Jahrgang 54 Nr. 03 März 2020

Frage 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welche Aussage ist korrekt? Die Halbwertszeit von Hydrochlorothiazid beträgt etwa Link zum Artikel [↗](#)

- a) 48-50 Std.
- b) 22-24 Std.
- c) 15-18 Std.
- d) 10-12 Std.
- e) 6-8 Std.



Jahrgang 54 Nr. 03 März 2020

Frage 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welches der genannten Symptome zählt nicht zur Definition der überaktiven Blase? [Link zum Artikel](#)

- a) Pollakisurie
- b) plötzlicher imperativer Harndrang mit Harnverlust
- c) plötzlicher imperativer Harndrang ohne Harnverlust
- d) Wiederholte Harnwegsinfekte
- e) nächtliches Aufwachen durch Harndrang

Jahrgang 54 Nr. 03 März 2020

Frage 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welche Antwort ist richtig? [Link zum Artikel](#)

- a) Gruppe B-Meningokokken führen in Europa sehr selten zu einer invasiven Infektion.
- b) Man kennt bei den Meningokokken 3 verschiedene Kapsel-Gruppen.
- c) In Großbritannien wurden 88% der Kinder während des Untersuchungszeitraums der Studie von Ladhani et al. mit dem neuen Meningitisimpfstoff 4CMenB geimpft.
- d) Im klinischen Alltag hatte die neue Impfung keinen relevanten schützenden Effekt.
- e) Die in dieser Studie untersuchte Impfung gegen Meningokokken wird in Deutschland von der STIKO routinemäßig empfohlen.



Jahrgang 54 Nr. 03 März 2020

Frage 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welche Aussage zur Anwendungsbegrenzung von hochdosierten Estradiol-Cremes zur intravaginalen Anwendung ist falsch? Link zum Artikel [☒](#)

- a) Die Anwendungsbegrenzung erfolgte aufgrund bisher fehlender Daten zur Langzeitsicherheit.
- b) Pharmakokinetische Daten zeigen eine erhebliche systemische Exposition gegenüber Estradiol.
- c) Die Behandlung ist auf einen Zeitraum von bis zu einem Jahr zu beschränken.
- d) Hochdosierte Estradiol-Cremes dürfen nicht zusätzlich zu einer anderen postmenopausalen Hormontherapie verschrieben werden.
- e) Die Anwendungsbegrenzung gilt nicht für Estriol-Cremes.

Jahrgang 54 Nr. 03 März 2020

Frage 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welcher der genannten zählt nicht zu den Risikofaktoren für eine Torsade de Pointes-Tachykardie bei einem erworbenen Long-QT-Syndrom durch Arzneimittel? Link zum Artikel [☒](#)

- a) eine hohe Serumkonzentration potenziell QT-Zeit-verlängernder Arzneimittel
- b) die gleichzeitige Einnahme mehrerer QT-Zeit-verlängernder Arzneimittel
- c) eine rasche Anflutung QT-Zeit-verlängernder Arzneimittel
- d) pharmakokinetische Interaktion mit Arzneimitteln, die die Elimination der QT-Zeit-verlängernden Arzneimittel verzögern
- e) eine Hypermagnesiämie



Derzeit ist bei rund 240 Medikamenten eine QT-Zeit-Verlängerung beschrieben. Bei wie vielen von diesen wurde bislang auch eine Torsade de Pointes-Tachykardie dokumentiert? Link zum Artikel [↗](#)

- a) 15%
- b) 25%
- c) 35%
- d) 45%
- e) 55%