

DER ARZNEIMITTELBRIEF

Zweitlinientherapie der Rheumatoiden Arthritis nach Versagen von Methotrexat

AMB 2013, 47, 53

Zweitlinientherapie der Rheumatoiden Arthritis nach Versagen von Methotrexat

Fazit: Bei Patienten mit refraktärer Rheumatoider Arthritis unter Ersttherapie mit Methotrexat ergab sich in dieser Studie kein therapeutischer Unterschied zwischen der Zugabe von Sulfasalazin plus Hydroxychloroquin oder der Zugabe von Etanercept nach ... [Bitte abonnieren oder Kennlernartikel anfordern ->](#)

Schlagworte zum Artikel:

[Etanercept](#), [Hydroxychloroquin](#), [Methotrexat](#), [RACAT-Studie](#), [Rheumatoide Arthritis](#), [Sulfasalazin](#), [TEAR-Studie](#), [TNF-alpha-Blocker](#), [TNF-alpha-Hemmer](#), [Tumor-Nekrose-Faktor-Antagonisten](#), [Tumor-Nekrose-Faktor-Blocker](#), [Tumor-Nekrose-Faktor-Hemmer](#),

Verlässliche Daten zu Arzneimitteln

DER ARZNEIMITTELBRIEF informiert seit 1967 Ärzte, Medizinstudenten, Apotheker und Angehörige anderer Heilberufe über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln.

DER ARZNEIMITTELBRIEF erscheint als unabhängige Zeitschrift ohne Werbeanzeigen der Pharmaindustrie. Er wird ausschließlich durch seine Leserinnen und Leser, d. h. durch die Abonnenten, finanziert. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir aktuelle Artikel nur auszugsweise veröffentlichen können.

DER ARZNEIMITTELBRIEF als Mitherausgeber

Gute Pillen – Schlechte Pillen

- unabhängige Gesundheitsinformationen für interessierte Laien
- Werbefrei und ohne Einfluss der Pharmaindustrie
- neutrale Berichte über Vor- und Nachteile von Therapien
- wissenschaftlich fundiert

Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist nur mit Genehmigung der Herausgeber des ARZNEIMITTELBRIEFS gestattet.

Zuverlässige Fakten finden
zum Studentenpreis



DER ARZNEIMITTELBRIEF
ist Mitglied in der



Werden Sie Abonnent!

- 12 Ausgaben pro Jahr
- Onlinezugang zum Archiv mit über 3000 Artikeln
- 36 CME Punkte pro Jahr für Ihr Konto bei der Ärztekammer

*Etanercept, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis, RACAT-Studie
*Hydroxychloroquin, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis, RACAT-Studie
*Methotrexat, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis, RACAT-Studie
*RACAT-Studie, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis
*Rheumatoide Arthritis, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis, RACAT-Studie
*Sulfasalazin, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis, RACAT-Studie
*TEAR-Studie, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis
*TNF-alpha-Blocker, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis, RACAT-Studie
*TNF-alpha-Hemmer, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis, RACAT-Studie
*Tumor-Nekrose-Faktor-Antagonisten, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis, RACAT-Studie
*Tumor-Nekrose-Faktor-Blocker, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis, RACAT-Studie
*Tumor-Nekrose-Faktor-Hemmer, Zweitlinientherapie bei Methotrexat-refraktärer Rheumatoider Arthritis, RACAT-Studie