

DER ARZNEIMITTELBRIEF

Das Aus für Nikotinsäure/Laropirant zur Behandlung der Hyperlipidämie

AMB 2013, 47, 22

Das Aus für Nikotinsäure/Laropirant zur Behandlung der Hyperlipidämie

Fazit: Mit der Marktrücknahme von Nikotinsäure/Laropirant (Tredaptive®) aufgrund eines ungünstigen Nutzen-Schaden-Verhältnisses endet nach einem halben Jahrhundert wohl die Ära der ... [Bitte abonnieren oder Kennlernartikel anfordern ->](#)

Schlagworte zum Artikel:

[AIM-HIGH-Studie](#), [AIM-HIGH-Studie](#), [ARBITER 6-HALTS-Studie](#), [Arteriosklerose](#), [Atherosklerose](#), [Cholesterin](#), [HPS2-THRIVE-Studie](#), [Hypercholesterinämie](#), [Koronare Herzkrankheit](#), [Laropirant plus Nikotinsäure](#), [Laropirant](#), [Nikotinsäure](#), [Tredaptive](#),

Verlässliche Daten zu Arzneimitteln

DER ARZNEIMITTELBRIEF informiert seit 1967 Ärzte, Medizinstudenten, Apotheker und Angehörige anderer Heilberufe über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln.

DER ARZNEIMITTELBRIEF erscheint als unabhängige Zeitschrift ohne Werbeanzeigen der Pharmaindustrie. Er wird ausschließlich durch seine Leserinnen und Leser, d. h. durch die Abonnenten, finanziert. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir aktuelle Artikel nur auszugsweise veröffentlichen können.

**DER ARZNEIMITTELBRIEF
als Mitherausgeber**

Gute Pillen – Schlechte Pillen

- unabhängige Gesundheitsinformationen für interessierte Laien
- Werbefrei und ohne Einfluss der Pharmaindustrie
- neutrale Berichte über Vor- und Nachteile von Therapien
- wissenschaftlich fundiert

**Zuverlässige Fakten finden
zum Studentenpreis**



DER ARZNEIMITTELBRIEF

ist Mitglied in der



Werden Sie Abonnent!

- 12 Ausgaben pro Jahr
- Onlinezugang zum Archiv mit über 3000 Artikeln
- 36 CME Punkte pro Jahr für Ihr Konto bei der Ärztekammer

*AIM-HIGH-Studie, Nikotinsäure zusätzlich zu Statinen? EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung für Laropirant plus Nikotinsäure
*AIM-HIGH-Studie, Nikotinsäure zusätzlich zu Statinen? EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung für Laropirant plus Nikotinsäure
*ARBITER 6-HALTS-Studie, Nikotinsäure zusätzlich zu Statinen? EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung für Laropirant plus Nikotinsäure
*Arteriosklerose, EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung für Laropirant plus Nikotinsäure
*Atherosklerose, EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung für Laropirant plus Nikotinsäure
*Cholesterin, EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung für Laropirant plus Nikotinsäure
*HPS2-THRIVE-Studie, Nikotinsäure zusätzlich zu Statinen? EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung für Laropirant plus Nikotinsäure
*Hypercholesterinämie, EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung für Laropirant plus Nikotinsäure
*Koronare Herzkrankheit, EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung für Laropirant plus Nikotinsäure
*Laropirant plus Nikotinsäure, EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung
*Laropirant, EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung für Laropirant plus Nikotinsäure
*Nikotinsäure, EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung für Laropirant plus Nikotinsäure
*Tredaptive, EMA empfiehlt Aufhebung der Zulassung