

# DER ARZNEIMITTELBRIEF

---

## Pausieren von oralen Antikoagulanzen bei Vorhofflimmern ist risikoreich

AMB 2013, 47, 04

### Pausieren von oralen Antikoagulanzen bei Vorhofflimmern ist risikoreich

**Fazit:** Die orale Antikoagulation bei Vorhofflimmern/-flattern wird nach einem dänischen Register bei 72% der Patienten innerhalb von 3,5 Jahren aus unterschiedlichen Gründen mindestens einmal kurzzeitig pausiert oder längere Zeit unterbrochen. Diese Pause ist mit ... [Bitte abonnieren oder Kennlernartikel anfordern ->](#)

#### Schlagworte zum Artikel:

[Absolute Arrhythmie](#), [Antikoagulanzen](#), [Apoplektischer Insult](#), [Herzrhythmusstörungen](#), [Hirnfarkt](#), [Phenprocoumon](#), [Rhythmusstörungen](#), [Schlaganfall](#), [Vorhofflimmern](#), [Warfarin](#),

#### Verlässliche Daten zu Arzneimitteln

**DER ARZNEIMITTELBRIEF** informiert seit 1967 Ärzte, Medizinstudenten, Apotheker und Angehörige anderer Heilberufe über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln.

**DER ARZNEIMITTELBRIEF** erscheint als unabhängige Zeitschrift ohne Werbeanzeigen der Pharmaindustrie. Er wird ausschließlich durch seine Leserinnen und Leser, d. h. durch die Abonnenten, finanziert. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir aktuelle Artikel nur auszugsweise veröffentlichen können.

**DER ARZNEIMITTELBRIEF  
als Mitherausgeber**

**Gute Pillen – Schlechte Pillen**

- unabhängige Gesundheitsinformationen für interessierte Laien
- Werbefrei und ohne Einfluss der Pharmaindustrie
- neutrale Berichte über Vor- und Nachteile von Therapien
- wissenschaftlich fundiert

**Zuverlässige Fakten finden  
zum Studentenpreis**



**DER ARZNEIMITTELBRIEF**

ist Mitglied in der



**Werden Sie Abonnent!**

- 12 Ausgaben pro Jahr
- Onlinezugang zum Archiv mit über 3000 Artikeln
- 36 CME Punkte pro Jahr für Ihr Konto bei der Ärztekammer

\*Absolute Arrhythmie, Absetzen oraler Antikoagulanzen risikoreich \*Antikoagulanzen, Absetzen oraler Antikoagulanzen bei Vorhofflimmern risikoreich \*Aproplektischer Insult, Absetzen oraler Antikoagulanzen bei Vorhofflimmern risikoreich \*Herzrhythmusstörungen, Absetzen oraler Antikoagulanzen bei Vorhofflimmern risikoreich \*Hirnfarkt, Absetzen oraler Antikoagulanzen bei Vorhofflimmern risikoreich \*Phenprocoumon, Absetzen oraler Antikoagulanzen bei Vorhofflimmern risikoreich \*Rhythmusstörungen, Absetzen oraler Antikoagulanzen bei Vorhofflimmern risikoreich \*Schlaganfall, Absetzen oraler Antikoagulanzen bei Vorhofflimmern risikoreich \*Vorhofflimmern, Absetzen oraler Antikoagulanzen risikoreich \*Warfarin, Absetzen oraler Antikoagulanzen bei Vorhofflimmern risikoreich