

# DER ARZNEIMITTELBRIEF

---

## Dosisabhängige Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Rheumapatienten und Therapie mit Biologika

AMB 2015, 49, 67

### Dosisabhängige Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Rheumapatienten und Therapie mit Biologika

**Fazit:** Verglichen mit einem klassischen DMARD (z.B. Methotrexat) erhöht die Basistherapie bei Rheumatoider Arthritis mit einem Biologikum dosisabhängig das Risiko für schwerwiegende Infektionen. Dies ist bei der gemeinsamen Therapieentscheidung zu berücksichtigen, und die Patienten sind hierüber entsprechend aufzuklären. [Bitte abonnieren oder Kennlernartikel anfordern ->](#)

#### Schlagworte zum Artikel

[Rheumatoide Arthritis](#), [Etanercept](#), [Infliximab](#), [Adalimumab](#), [Certolizumab](#), [Golimumab](#), [Anakinra](#), [Tocilizumab](#), [Ustekinumab](#), [Secukinumab](#), [Rituximab](#), [Abatacept](#), [Spondyloarthritis](#), [Spondylarthritis](#), [Spondylarthropathien](#), [Biopharmazeutika](#), [Biologika](#),

**Alle Artikel zum Schlagwort: Rheumatoide Arthritis,**

**Dosisabhängige Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Rheumapatienten und Therapie mit Biologika** [2015, 49, 67](#)

**Cannabinoide als Arzneimittel** [2015, 49, 41](#)

**Zweitlinientherapie der Rheumatoiden Arthritis nach Versagen von Methotrexat** [2013, 47, 53](#)

**Zweitlinientherapie bei MTX-refraktärer früher Rheumatoider Arthritis – Biologika oder konventionelle Basistherapie?** [2012, 46, 41](#)

**Infektionsrisiken bei Behandlung von Autoimmunerkrankungen mit Tumor-Nekrose-Faktor-Antagonisten** [2012, 46, 21](#)

**Prednison-Präparat mit verzögerter Freisetzung des Wirkstoffs verkürzt die Dauer der Morgensteifigkeit bei Rheumatoider Arthritis** [2008, 42, 42](#)

## Verlässliche Daten zu Arzneimitteln

**DER ARZNEIMITTELBRIEF** informiert seit 1967 Ärzte, Medizinstudenten, Apotheker und Angehörige anderer Heilberufe über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln.

**DER ARZNEIMITTELBRIEF** erscheint als unabhängige Zeitschrift ohne Werbeanzeigen der Pharmaindustrie. Er wird ausschließlich durch seine Leserinnen und Leser, d. h. durch die Abonnenten, finanziert. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir aktuelle Artikel nur

### **DER ARZNEIMITTELBRIEF als Mitherausgeber**

#### **Gute Pillen – Schlechte Pillen**

- unabhängige Gesundheitsinformationen für interessierte Laien
- Werbefrei und ohne Einfluss der Pharmaindustrie
- neutrale Berichte über Vor- und Nachteile von Therapien
- wissenschaftlich fundiert

en können

### **Zuverlässige Fakten finden zum Studententpreis**



### **DER ARZNEIMITTELBRIEF ist Mitglied in der**



### **Werden Sie Abonnent!**

- 12 Ausgaben pro Jahr
- Onlinezugang zum Archiv mit über 3000 Artikeln
- 36 CME Punkte pro Jahr für Ihr Konto bei der Ärztekammer

\*Rheumatoide Arthritis, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Etanercept, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Infliximab, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Adalimumab, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Certolizumab, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Golimumab, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Anakinra, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Tocilizumab, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Ustekinumab, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Secukinumab, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Rituximab, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Abatacept, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Spondyloarthritis, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Spondylarthritis, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Spondylarthropathien, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie mit Biologika \*Biopharmazeutika, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie der Rheumatoiden Arthritis \*Biologika, Zunahme schwerwiegender Infektionen bei Therapie der Rheumatoiden Arthritis